

Herbitsiid

Toimeaine: püridaat 450 g/kg

Preparaadi vorm: märguv pulber (WP)

- Tärkamisjärgne herbitsiid.
- Lehtede kaudu mõjuv kontaktne toimeviis.
- Üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks.
- Väga paindlik pritseskeemides.

Registreeritud kasutamiseks sibula, talisibula, porrulaugu, šalottsibula, küüslaugu, brokoli (ehk spargelkapsa), peakapsa, lillkapsa, brüsseli kapsa (ehk rooskapsa), spargli, lehtkapsa, kähara peakapsa (ehk savoia kapsa), nuikapsa ja söödakapsa põldudel.

### Pritsimissoovitused

- Pritsida kuiva taimikut, kui õhutemperatuur on üle 10° C.
- Kõrge temperatuur (üle 25° C) võib tekitada fütotoksilisust.
- Parima tulemuse saavutamiseks pritsida väikeseid kuni 4 pärislehe faasis olevaid umbrohtusid, mis on aktiivses kasvujõus.
- Tagada korralik kattuvus pritsimisvedelikuga.
- Parem tulemus saavutatakse jagatud pritsimisega.

### Kapsaliste pritsimisel oluline jälgida:

- Pritsi Lentagrani tugevale ja täiskasvujõus taimedele (peale istutamist peavad taimed olema hästi kasvama hakanud, soovituslikult 2 nädalat peale istutamist).
- Pritsimine tuleb teha enne kultuuri 6 lehe faasi.
- Mõningatel juhtudel võib esineda kultuuril ajutiselt kahjustust, pärast 6-8 nädala möödumist sümptomid kaovad.
- Kui kapsas on kaetud kattelooriga, siis on soovituslik vähemalt üks päev enne pritsimist katteloor eemaldada.





Kultuur	Ühekordsel pritsimisel kulunorm, kg/ha	Jaotatud pritsimisel minimaalne ühekordne kulunorm, kg/ha	Kasutamise aeg ja pritsimiskordade arv	Ooteaeg päevades
Peakapsas, Brüsseli kapsas (ehk rooskapsas), lehtkapsas, kähär peakapsas (ehk savoia kapsas).	2	0,5	Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või kultuuri 4 lehe faasist kuni 6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16. Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	42
Brokoli (ehk spargelkapsas), lillkapsas.	1	0,5	Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või kultuuri 4 lehe faasist kuni 6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16. Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	42
Söödakapsas	2	0,5	Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või kultuuri 4 lehe faasist kuni 6 lehe faasini. Kasvufaasis 14-16. Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	42
Sibul (seemnest või tippsibulast), šalottsibul (seemnest, tippsibulast).	1	0,5	Pritsimist alustada, kui kultuuril on 1. leht selgelt nähtav kuni kultuuri 4. lehe faasini. Kasvufaasis 11-14. Jaotatud pritsimisel kuni 3 pritsimist.	56
Talisibul	1	0,5	Pärast tärkamist, kui kultuuril on kolmas leht selgelt nähtav (>3 cm). Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	28
Porrulauk	2	0,5	Pärast istutamist, kui kultuuril on kolmas leht selgelt nähtav (>3 cm). Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	28
Küüslauk	2	0,5	Pärast mahapanekut, kui kultuuril on kolmas leht selgelt nähtav (>3 cm). Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	56
Nuikapsas	2	0,5	Kasutada 2-4 nädalat pärast istutamist või kasvufaasis 14-16. Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	42
Spargel	2	-	1) Enne tärkamist 2) Vastavalt lehemassile pärast saagikoristust. 1 pritsimine.	-
Äsja istutatud spargel.	1	0,5	Kasutada alates kasvufaasist 21. Jaotatud pritsimisel kuni 2 pritsimist.	-

**Maksimaalne kogus kultuurile kasvuperioodi kohta on 2 kg/ha.**

Väga hea või hea mõju järgnevate umbrohtude suhtes: valge karikakar, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, harilik kassitapp, roomav madar, paljas võõrkakar, verev iminõges, üheaastane seljarohi.