

- Süsteemne mullaherbitsiid.
- Tärgamiseelne herbitsiid, kuid võib kasutada ka kohe pärast kultuuri ja/või umbrohu tärgamist.
- Lühiealiste umbrohtude tõrjeks.

Registreeritud kasutamiseks tali- ja suvirapsil, tali- ja suvirüpsil, kapsal, brüsseli kapsal, brokolil, lehtkapsal ja lillkapsal.

Pritsimissoovitused

- Metasakloori optimaalseks levikuks ja toime saavutamiseks on vajalik mullaniiskus.
- Kuivades tingimustes, kus niiskust ei ole küllaldaselt, võib herbitsiidne toime viibida kuni vihmade tulekuni.
- Korralik mulla ettevalmistus, optimaalne külvipeenra niiskus, ühtlane ja mure kamakatevaba muld aitab kaasa herbitsiidi levikule, neeldumisele ja efektiivsusele.
- Kamakate vähendamine külvijärgse rullimisega ja korralik põhu käitlus omab samuti positiivset mõju efektiivsele umbrohtude tõrjele.
- Herbitsiidi efektiivsus sõltub samuti kultuurist ja pritsimise ajast.

Rapsan 400 SC kulunorm ja pritsimisaeg

Kultuur	Kulunorm (l/ha)	Pritsimisaeg
Tali- ja suviraps, tali- ja suvirüps.	1,875	Kasvufaasis BBCH 0-9 (idanemisest kuni tärgamiseni) või BBCH 10-18 (idulehtedest kuni 8 leheni).
Kapsas, brüsseli kapsas, brokoli, lehtkapsas ja lillkapsas.	1,875	Kasvufaasis BBCH 0-9 (idanemine) või BBCH 10-24 (lehestiku areng kuni 9. leht on avanenud).

Maksimaalne pritsimiskordade arv kasvuperioodi jooksul on 1 kord.

Järelkultuurid

Rapsan 400 SC-ga töödeldud normaalsel ajal koristatud talirapsile võib järgneda mistahes kultuur ja künd ei ole hädavajalik enne järgmise teravilja kultuuri külvi.

Ümberkülv samal sügisel: vähemalt 20 cm sügavuse kündmise järel: talioder või talinisu.

Ümberkülv järgmisel kevadel: kündmise järel võib külvata järgmisi kultuure: suviraps (või teised ristõielised kultuurid), teraviljad (suvinisu, oder, kaer), ümberistutatud või otse külvatud ristõielised, põlduba, hernes, kartul ja mais, linaseemned, suhkrupeet.

Ümberkülv pärast kasutamist kevadel: pärast kasutamist ristõielistel kultuuridel kevadel soovitatakse ümberkülviks teisi ristõieliste kultuure või kartulit.

