

- Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks.
- Mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks.



## Pritsimissoovitused

- Shirlan 500 SC on kaitsev kontaktse toimega preparaat.
- Pritsida tuleb PROFÜLAKTILISELT, enne haiguse ilmumist.
- Pritsimise aeg kasvufaasis BBCH 40-97.
- Pritsida maksimaalselt kuni 8 korda hooaja jooksul.
- Esimest korda tuleb Shirlan 500 SC-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, hiljemalt enne kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.
- Soovitav on pritsida pärast süsteemse ja kontaktse tootega Ridomil Gold MZ 68 WG või pärast Revus-ga pritsimist.

## Pritsimiste vahe:


Väike oht: 14 päeva profülaktiliselt, enne lehemädanikule soodsate tingimuste tekkimist.

Suur oht: 10 päeva (niiske, soe ilm).

Tõsine oht: 7 päeva pikaajaline soe ja niiske ilm, läheduses lehemädaniku lööbimine.

- Kulunorm: 0,3 – 0,4 l/ha
- Töölahuse kulunorm: 200-500 l/ha
- Ooteaeg: 7 päeva

## Mõju:



## Soovitused:

Pritsida Shirlaniga 1-2 x 0,4 l/ha kulunormiga, kui taim on lõpetanud uute võrsete tekke/mugulate kaitseks;

