

Floramite 240 SC

Floramite 240 SC'd võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeaine: bifenasaat 240 g/l (22,62%)
Bioloogiliselt mitteaktiivne aine: propaan-1,2-diool
Suspensioonikontsentraat
Säilivusaeg: 2 aastat
Pakendid: 250 ml, 1 l, 5 l

Loa valdaja, tootja ja pakendaja:

Arysta LifeScience Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041-AT Amsterdam, Madalmaad

Loa number: 722/27.08.18



Tähelepanu!

H317 - Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni.
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P260 - Auru ja pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P314 - Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe8 - Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks mitte kasutada mesilaste aktiivse lendluse ajal.

Sisaldab ohtlikke aineid: bifenasaat; 1,2-bensisotiasoliin-3-oon.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefoni number: 112, mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662.

Toimeviis

Floramite 240 SC on kontaktne akaritsiid, mis on ette nähtud võrgendilestlaste kontrolli all hoidmiseks põldudel. Antud toode on kontsentreeritud suspensiooni kontsentraadina vees lahustamiseks ning toimib taime pinnal.

Toode on ette nähtud kasutamiseks iseliikuva või traktorile paigaldatud põllumajandusliku pihustusseadmega. **Käsipritsi kasutamine keelatud!**

KASUTUSJUHISED

Maasikas (avamaal)

Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,6 l/ha

Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.

Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.

Soovitatud veekogus: 1000–1500 l/ha.

Kasutusaeg: kahjustajate ilmumisel märtsist septembrini kasvufaasides BBCH 40-87.

Ooteaeg: 1 päev.

TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMINE AVAMAAL VÄHELEVINUD KULTUURIDE PUHUL

Kasutusala laiendamine vähelevinud kultuuridele (toote tõhususe või fütotoksilisuse eest vastutab selle kasutaja)

Lilled ja teised dekoratiivtaimed, kurk, suvikõrvits, vaarikas, aedmurakas

Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,6 l/ha

Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.

Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.

Soovitatud veekogus lilledele, dekoratiivtaimedele, kurgile, suvikõrvitsale: 1000-1500 l/ha; vaarikale ja aedmurakale: 1000-1200 l/ha.

Soovitatud: väikeste piiskadega pihustamine.

Ooteaeg: 1 päev.

Punased ja mustad sõstrad

Punane kedriklest (Tetranychus urticae)

Kulunorm: 0,4 l/ha

Maksimaalne töötlemiskordade arv kasvuhooajal: 2.

Töötlemiskordadevaheline intervall: vähemalt 7 päeva.

Soovitatud veekogus: 400–1000 l/ha.

Soovitatud: väikeste piiskadega pihustamine.

Ooteaeg: 1 päev.

Floramite 240 SC kasutusaeg:

- lilled ja teised dekoratiivtaimed- kahjustajate ilmumisel märtsist septembrini

- kurk- kahjustajate ilmumisel
- suvikõrvits- kahjustajate ilmumisel kasvufaasides BBCH 15-89
- vaarikas, aedmurakas, punane ja must sõstar- kahjustajate ilmumisel kuni kasvufaasini BBCH 85.

ETTEVAATUSABINÕUD JA SOOVITUSED VASTAVALT HEALE PÕLLUMAJANDUSTAVALE

1. Resistentsuse vältimiseks järgige järgmisi reegleid:
 - Igal kultuuril tohib Floramite 240 SC'd kasutada kuni 2 korda kasvuhooajal.
 - Kui kultuuril on vajalik täiendav kahjuritõrje, kasutage teise toimeviisiga taimekaitsevahendeid.
 - Kasutamise vajadus tuleb määrata vastavalt kahjustajate esinemisele. Taimekaitsevahendit tuleb kasutada viivitamatult, kui kahjurite kahjulikkuse lävi on ületatud. Ärge oodake kahjurite populatsiooni suurenemist.
 - Kasutage ettenähtud kulunormi.
 - Järgima peab integreeritud taimekaitse võtteid ning võimalusel ka bioloogilisi meetodeid.
2. Enne toote esmakordset kasutamist kultuuril, viige läbi testimisprotseduur ja veenduge, et 7 päeva jooksul ei teki fütotoksilisi sümptomeid.
3. Tugeva päikesevalguse vältimiseks tuleb kaitstavaid pritsitavaid töödelda hommikul või õhtul.

TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Enne töölahuse ettevalmistamist tuleb määrata vajalik kogus. Valage mõõdetud kogus vahendit osaliselt veega täidetud pihustuspaaki (segaja peab olema sisse lülitatud). Loputage tühjenud anumaid kolm korda veega ja kallake loputusjääd töölahuse pihustuspaaki. Lisage vajalik kogus täiendavat vett ja segage põhjalikult. Pärast taimekaitsevahendi pihustuspaaki valamist, segage lahust mehaaniliselt (kui paak ei ole varustatud hüdraulilise segajaga).

TÖÖLAHUSE JÄÄKIDE KÄITLEMINE JA VAHENDITE PESEMINE

Töölahuse kasutamise järgsel käitlemisel tuleb arvestada pinnase ja põhjavee saastamise riski vältimisega:

- üle jäänud pritsimisegu pritsige töödeldud põllule või
- kõrvaldage jäägid tehnoloogilise lahenduse abil, mis tagab toimeainete biodegradatsiooni, või
- kõrvaldage toode mõnel muul kohalikele jäätmekäsitluse nõuetele vastaval viisil.

Peske seadmeid pärast tööd põhjalikult.

Seadmete pesemiseks kasutatud vett tuleb käidelda sarnaselt töölahuse jääkidele. Rakendage samu isikukaitsevahendeid.

TOOTE OHUTU KASUTAMISE TINGIMUSED

Toodet kasutavate isikute ettevaatusabinõud.

Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

Töölahuse ettevalmistamisel ja pihustamise ajal kasutada kaitsekindaid ja kaitseriietust, mis kaitsevad taimekaitsevahendite mõju eest, asjakohaseid jalanõusid (näiteks kummisaapad).

Keskkonkainetega seotud ettevaatusabinõud.

Taimekaitsevahend või selle pakend ei tohi saastada vett.

Seadmeid mitte pesta pinnavee läheduses.

Vältige veereostust talude ja teede äravoolukraavide kaudu.

Toote kasutamise ja inimeste/loomade kasutusalaale ligipääsu lubamise periood: mitte siseneda enne töölahuse täielikku kuivamist taimede pinnal.

TAIMEKAITSEVAHENDI HOIUSTAMISE TINGIMUSED, TAIMEKAITSEVAHENDI JA PAKENDI KÕRVALDAMINE

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Taimekaitsevahendi hoiustamine:

- asukohas või ruumis, kus on tagatud asjakohased lahendused keskkonnasaaste ja kõrvaliste isikute juurdepääsu välistamiseks,
- originaalpakendis ja viisil, mis välistab kokkupuute toiduainete, jookide, ravimite ja loomasöödaga,
- jahedas, hästi ventileeritud kohas.

Taimekaitsevahendi tühja pakendit ei tohi kasutada muul eesmärgil.

Kasutamata toode tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumisega tegelevale asutusele.

ESMAABI

Vastumürk: puudub, sümptomaatiline ravi.

Vajadusel pöörduda arsti poole ja võtta kaasa pakend või silt.

Nahale sattumisel: pesta rohke vee ja seebiga.

Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.