

Shirlan 500 SC

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Kasutusala: Fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks ja mugulate pruunmädanikku nakatumise vältimiseks.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: avamaa sibul.

NB! Kuna Shirlan 500 SC on laiendatud kasutamiseks avamaa sibulale professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Toimeaine: 500 g/l fluasinaam

Preparaadi vorm: Suspensioonikontsentraat (SC)

Pakendid: 1; 5; 10; 20 L

Eesti reg-nr: 0216/29.10.09

Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.

Toodet on lubatud kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toode sisaldab ohtlikku ainet: fluasinaam.

Kasutuspiirangud: Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.



Hoiatus!

H317- Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H361d- Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet.

H410- Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EUH401- Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P102- Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P201- Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P261- Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.

P280- Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352- NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P308+P313- Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P391- Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501- Viige sisu/mahuti heakskiidetud põletus-/ümbertöötlemistehasesse vastavalt riiklikele regulatsioonidele.

SP1- Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreanaažide).

SPe3- Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogu veepiirist.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest

tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Loa valdaja: ISK Biosciences Europe N.V., De Kleetlaan 12 b, Box 9, 1831 Diegem, Belgia
Valmistaja/pakendaja: ISK Biosciences Europe N.V., De Kleetlaan 12 b, Box 9, 1831 Diegem
- Belgia

Maaletooja:

Scandagra Eesti AS, Tähe 13, 71012 Viljandi, Viljandimaa, tel. +372 4354333

Baltic Agro AS, Rukki tee 8, Lehmja küla, 75306 Rae vald, Harjumaa, Eesti.

Esmaabi

Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe neid nahapindu, kuhu toode on sattunud, rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on allaneelatud suur kogus kontsentrati, pöörduge arsti poole. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Kasutamine

Shirlan 500 SC on kaitsev kontaktse toimega preparaat.

-PRITSIDA TULEB PROFÜLAKTILISELT, ENNE HAIGUSE ILMUMIST.

-PRITSIMISE AEG kasvufaasides BBCH 40-97.

-PRITSIDA MAKSIMAALSELT KUNI 8 KORDA HOOAJA JOOKSUL.

Esimest korda tuleb Shirlan 500 SC-ga pritsida, kui ilm on haiguse levikuks soodne, HILJEMALT ENNE kartulitaimede kokkukasvamist vagudes.

Soovitav on pritsida pärast Revus-ga pritsimist.

Kartul:

Kasutuskordi: 8

Pritsimiste intervall:

Väike oht: 14 päeva profülaktiliselt, enne lehemädanikule soodsate tingimuste tekkimist.

Suur oht: 10 päeva (niiske, soe ilm)

Tõsine oht: 7 päeva pikaajaline soe ja niiske ilm, läheduses lehemädaniku lööbimine.

Kulunorm: 0,3 – 0,4 l/ha

Vee kulunorm: 200-500 l/ha

Ooteaeg: 7 päeva

Sibul:

Kasutuskordi: 1

Kulunorm: 0,5l/ha

Vee kulunorm: 200-400 l/ha

Ooteaeg: 7 päeva

Resistentsus

Toote korduv kasutamine võib põhjustada lehemädaniku resistentsust. Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitusete saamiseks võtke palun ühendust toote edasimüüjaga.

Tähelepanu kasutamisel

Fungitsiidi valem kasutamisel muutuvad kartuli-lehemädanikku tekitava seene tüved tõrjevahendile vastupidavaks, mistõttu preparaadi efektiivsus võib kahaneda ja saak väheneda. Seepärast tuleb kulunormi ja pritsimiskordade soovitustest täpselt kinni pidada.

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita poolenisti veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Shirlan 500 SC-d pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.

Paagisegud

Shirlan'i sobib kasutada koos Karate Zeon'iga. Samuti mangaan- ja magneesiumsulfaadiga. Kahtluse korral tuleb paagisegu sobivust eelnevalt väikesel pinnal katsetada.

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 3 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida otsesest päikesevalgust ning temperatuuri alla 0°C ja üle +35 °C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse vrnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Kahjutustamine:

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Välja voolanud preparaat koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Kasutatud tühjad pakendid tuleb loputada veega vähemalt 3 korda. Loputusvesi lisada pritsimislahusele. Loputatud taara muuta kasutamiskõlbmatuks ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk

Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.

Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälisestest teguritest.

Olemasolevate või tekkivate resistentsete seenetüvede vastu võivad fungitsiidid osutada väheefektiivseteks ning selle tulemusel saak väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta tootja ega selle edasimüüja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebatõhusus resistentsete tüvede korral.

Kõik soovitusel toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.