

# DIFCOR 250 EC

Toimeaine: difenokonasool 250 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

- Süsteemse toimega fungitsiid, mis kuulub triasoolide keemilisse klassi.
- Kaitseb talirapsi, õunapuud ning pirnipuud.
- Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele avamaal: spargel, söögipeet, sigur, aedpiimjuur, porgand, juurpetersell, pastinaak, juurseller, aed-mädarõigas, naeris, kaalikas, varsseller, apteegitill, brokoli, lillkapsas, peakapsas, brüsseli kapsas, spinat, lehtpeet, roosid, maitsetaimed ja seemnest kasvatatavad dekoratiivtaimed.

## Pritsimissoovitused:

- Lokaalne süsteemne toime – imendub taime lehtedesse ja seetõttu väga oluline, et taim saaks tootega korralikult kaetud.
- Püsib taimes kuni 14 päeva (optimaalselt 7-8 päeva) – tagades pikaajalise toime.
- 96 tundi pärast nakatumist on jätkuvalt efektiivne – raviv toime.
- Pritsida, kui õhu temperatuur on üle 12 kraadi. Soe õhutemperatuur soodustab Difcor 250 EC imendumist taime lehtedesse (16 kraadi ja rohkem).
- Vihmakindel 2 tundi pärast pritsimist.
- Vahendit kasutada vaheldumisi teistesse keemilistesse rühmadesse kuuluvate fungitsiididega.

Kultuur	Kahjustaja	Pritsimise aeg	Maksimaalne pritsimiste arv hooajal/ootaeg
Taliraps	Ristõieliste kuivlaikus ( <i>Alternaria brassicae</i> ), valgemädanik ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> ).	Kasutada õitsemisperioodi algusest kuni 50% kõtradest on moodustunud (BBCH 60-65).	1/56.
Õunapuu, pirnipuu	Õunapuu kärntõbi ( <i>Venturia inaequalis</i> ), pirnipuu kärntõbi ( <i>Venturia pyrina</i> ), õunapuu- jahukaste ( <i>Podosphaera leucotricha</i> ).	Alates õiepungade roosast värvusest kuni viljade ja seemnete küpsemise lõpuni (BBCH 57-89).	4 (7-päevase intervalliga) /14.
Spargel	Rooste ( <i>Puccinia asparagi</i> ), laikususe tekitaja ( <i>Stemphylium botryosum</i> ).	Kasutada toodet peale söödavate osade koristamist.	3 (14-päevase intervalliga).
Söögipeet	Peedirooste ( <i>Uromyces betae</i> ).	Pritsida alates 10 lehe faasist kuni juurikate tarbimiseni (BBCH 20-89). BBCH 20-39 võib teha ühe pritsimise.	3 (14-päevase intervalliga) /30.
Sigur	Rooste ( <i>Puccinia hieracii</i> ), korvõieliste- jahukaste ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ).	Pritsida profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.	3 (14-päevase intervalliga) /30.
Juurseller	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> ), jahukaste ( <i>Erysiphe heraclei</i> ).	Pritsida alates 10 lehe faasist, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne saagikoristust. BBCH 20- 39 võib teha ühe pritsimise.	3 (14-päevase intervalliga) /21.
Aed-piimjuur (Tragopogon porrifolius)	Korvõieliste-jahukaste ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ).	Porgand: pritsida alates 10 lehe faasist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva enne saagikoristust. BBCH 20-39 võib teha ühe pritsimise.	3 (14-päevase intervalliga) /14.
Porgand, juurpetersell pastinaak	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> ), jahukaste ( <i>Erysiphe heraclei</i> ).		
Aed- mädarõigas	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> ), jahukaste ( <i>Erysiphe cruciferarum</i> ).		
Naeris, kaalikas	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> ).		
Varsseller, apteegitill	Helelaikus ( <i>Septoria spp.</i> ).	Pritsida profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel. BBCH 20-39 võib teha ühe pritsimise.	3 (14-päevase intervalliga) /21.

Brokoli, lillkapsas	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> )	Pritsida alates pea moodustumise algusest BBCH 40-89 või esimene kord BBCH 20-39 ja teine BBCH 40-89.	3 (14-päevase intervalliga) /14.
Peakapsas, brüsseli kapsas	Kuivlaikus ( <i>Alternaria spp.</i> )	Pritsida alates külgmiste pungade arenemisest BBCH 40-89 või esimene kord BBCH 20-39 ja teine BBCH 40-89.	3 (14-päevase intervalliga) /21.
Spinat, lehtpeet ( <i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>vulgaris</i> )	Peedirooste ( <i>Uromyces betae</i> )	Pritsida alates 10 lehe faasist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne koristamist (BBCH 20-89). Alates 10 lehe faasist kuni roseti täieliku välja kujunemiseni võib teha maksimaalselt 2 pritsimist.	3 (14-päevase intervalliga) /30.
Avamaa roosid	Roosi-jahukaste ( <i>Podosphaera pannosa</i> ), roosi- tõlvrooste ( <i>Phragmidium mucronatum</i> ).	Pritsige profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.	2 (14-päevase intervalliga).
Maitsetaimed	Jahukasted ( <i>Erysiphales</i> ), roosted ( <i>Pucciniales</i> )	Pritsige profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel BBCH 20-89. BBCH 20-39 võib teha ühe pritsimise.	3 (14-päevase intervalliga) /30.
Seemnest kasvata- tavad dekoratiiv- taimed	Jahukasted ( <i>Erysiphales</i> ), roosted ( <i>Pucciniales</i> )	Pritsige profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.	3 (14-päevase intervalliga).

**Kulunorm kõikide kultuuride puhul on 0,5 l/ha, v.a õunapuudel ja pirnipuudel on see 0,2 l/ha.**

