

Floramite

240SC

Akaritsiid

Toimeaine: bifenasaat 240 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentratsioon

- Kontaktne akaritsiid.
- Võrgendilestlaste kontrolli all hoidmiseks põldudel.
- Toimib taime pinnal.

Kultuur	Kulunorm, l/ha	Kasvufaas, BBCH	Kasutuskordi kasvuperioodi jooksul	Ooteaeg, päeva
Maasikas (avamaa)	0,6	40-87	2	1
Lilled ja teised dekoratiivtaimed, kurk	0,6	Punase kedriklesta esinemisel	2	1
Suvikõrvits	0,6	15-89	2	1
Vaarikas, aedmurakas	0,6	<85	2	1
Punased ja mustad sõstrad	0,4	<85	2	1

Punase kedriklesta (*Tetranychus urticae*) suhtes on efektiivsus mitmel erineval kasvujärgul:

- muna
- vastne (enne täiskasvanuks saamist)
- valmik



Kiire mõju

- vähendab otseselt söömust (vastsed ja valmikud muutuvad hüperaktiivseks 3 tunni möödumisel).
- sureb pärast pritsimist 3-4 päeva pärast.

Kedriklesta tõrjumisel on oluline meeles pidada:

- Kui kultuuril on vajalik täiendav kahjuritõrje, kasutage teise toimeviisiga taimekaitsevahendeid.
- Kasutamise vajadus tuleb määrata vastavalt kahjustajate esinemisele. Taimekaitsevahendit tuleb kasutada viivitamatult, kui kahjurite kahjulikkuse lävi on ületatud. Ärge oodake kahjurite populatsiooni suurenemist.
- Kasutage ettenähtud kulunormi ja suurt kogust vett.
- Vee pH peab olema madal, liiga kõrge vee pH korral laguneb toimeaine paagisegus kiiresti ja võib oluliselt vähendada tõrjeefektiivsust.
- Järgima peab integreeritud taimekaitse võtteid ning võimalusel ka bioloogilisi meetodeid.
- **Sõbralik toode kasulike putukate suhtes.**

